

Rotující černé díry

Černá díra o hmotnosti M je charakterizována **Schwarzschildovým poloměrem** R_S , na němž končí platnost současné fyziky (včetně **obecné teorie relativity**).

Popis toho, co se děje pod **horizontem události** černé díry není znám ani teoreticky - neexistuje totiž zatím teorie, která by byla schopná sloučit obecnou teorii relativity (teorii silných gravitačních polí) a **kvantovou mechaniku** (teorii mikroskopických rozměrů). A pro fundovaný popis **singularit** (zrod vesmíru, vnitřek černých děr, ...) je nutné tyto dvě teorie sloučit.


Nacházíme se totiž ve velmi malých oblastech, které jsou zdrojem silného **gravitačního pole**.

Pokud černá díra nerotuje (viz obr. 102a), je povrch **Schwarzschildovy koule** (tj. koule o Schwarzschildově poloměru) totožný s plochou nekonečně velkého červeného posuvu z_∞ .

Jestliže ale černá díra rotuje (viz obr. 102b), pak se její poloměr s rostoucí **velikostí rychlosti rotace** zmenšuje. V případě maximální velikosti rychlosti rotace se její poloměr rovná polovině Schwarzschildova poloměru nerotující černé díry (při stejné hmotnosti).

Maximální velikost rychlosti rotace znamená, že „rovník“ černé díry rotuje **rychlostí** o **velikosti rychlosti světla** ve **vakuu** c .

Plochou nekonečně velkého červeného posuvu je v tomto případě elipsoid s hlavní **poloosou** rovnou R_S a vedlejší poloosou rovnou $0,5R_S$. Prostor mezi elipsoidem a menší Schwarzschildovou koulí se nazývá **ergosféra** černé díry. Z této oblasti je možné odebírat **energii** černé díry do okolního vesmíru.



Obr. 102

Pokud se do ergosféry dostane nějaká **částice** (či větší těleso) mohou nastat dvě situace:

1. Částice je černou dírou pohlcena.

Taková částice navždy mizí v černé díře bez možnosti návratu zpět do „našeho“ vesmíru.

2. Částice se rozpadne na dvě složky: jedna padá do černé díry a druhá vyletí z ergosféry ven s vyšší energií, než měla celá částice před vstupem do ergosféry. Větší energii částice získala na úkor **rotační energie** černé díry. To ale znamená, že po mnoha takových procesech se může postupně zastavit **rotace** černé díry a ergosféra zanikne.

Černá díra pak bude „obyčejnou“ černou dírou, tj. nebude rotovat.

Ergosféra je tedy silným zdrojem záření (hlavně **rentgenového záření**) a samotnou černou díru tak vlastně „maskuje“. Přísun hmoty do černé díry je reálný hlavně u těsných **dvojhvězd**, jejichž jednou složkou je rotující černá díra. V případě, že se černá díra nachází ve vesmíru osamoceně, je její existence velice těžko dokazatelná.

Na základě těchto úvah je možné vysvětlit energetický zdroj kvasarů. Opravdu se zdá, že

kvasary lze vysvětlit existencí supermasivních rotujících černých děr, které mají hmotnosti až $10^9 M_{\odot}$ (kde M_{\odot} je hmotnost [Slunce](#)), v jádrech některých [galaxií](#). Hmotou, která tvoří hmotu černé díry, je pak jakákoliv [mezihvězdná hmota](#) či [hvězdná](#) hmota dopadající obrovskou rychlostí na povrch černé díry.

Tímto způsobem (pomocí právě popsaného „čerpání“ energie z černé díry) je černá díra vlastně spojena s okolním světem ještě jedním způsobem (kromě silného gravitačního pole).

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.