Diferenciální a integrální počet, funkce

Symbol	Název	První použití
$\frac{dy}{dx}$	derivace	1684 - Gottfried Wilhelm Leibniz
$\int$	integrál	1650 - Henry Oldenburg použil tento symbol při zpracování Newtonových rukopisů
$f', f'', \ldots$	první, druhá, … derivace funkce	1800 - Joseph Louis Lagrange
$f(x)$	zápis funkce	1734 - Leonhard Euler
log *x*	logaritmus	1616 - Edward Wight ve tvaru **Log** (v překladu Johna Napiera, který ale užil jinou zkratku); 1632 - Bonaventura Cavalieri ve tvaru **log**.
sin *x*	sinus	1624 - Edmund Gunter
cos *x*	kosinus	1674 - Jonas Moore ve tvaru **Cos**; 1696 - Samuel Jeake ve tvaru **cos**.
tg *x*	tangens	první použití tg *x* není zjištěno; 1583 - Thomas Fincke poprvé použil tvar tan *x*, který se používá se světě častěji.

tab. 5

© Encyklopedie Fyziky (http://fyzika.jreichl.com); Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ zakazuje úpravy a komerční distribuci.