


***Lagrangeovy librační body


V roce 1772 se francouzský matematik Joseph Luis de Lagrange (1736 - 1813) zabýval [problémem tří těles](#), která se periodicky pohybují. Zjistil, že po určité době se tato tři tělesa, z nichž jedno má zanedbatelně malou hmotnost vůči ostatním, vracejí do výchozí polohy a mají stejné vektory [rychlostí](#), jaké měly na začátku sledování [pohybu](#).

Z tohoto poznatku odvodil, že pro každou soustavu dvou těles o hmotnostech m_1 a m_2 , z nichž jedno obíhá kolem druhého (resp. obě obíhají kolem společného [těžiště](#)) existuje pět libračních bodů L_1 až L_5 (v souřadnicovém systému, který se otáčí spolu se spojnicí obou těles). Tyto librační body jsou místa, kde se přitažlivé [gravitační síly](#) a [odstředivé síly](#) působící na malé těleso hmotnosti m ($m \ll m_1$ a $m \ll m_2$) vyrovnávají. Na základě označení podle obr. 22 lze výpočtem ukázat, že poloha tělesa o hmotnosti m není stabilní v bodech L_1 , L_2 a L_3 , zatímco v bodech L_4 a L_5 stabilní je.

To znamená, že tělesa v libračních bodech L_4 a L_5 jsou po určitou dobu ve stabilní [rovnováze](#), tj. z hlediska gravitačního potenciálu zde existuje mělké minimum. Vlivem dalšího působení okolních těles resp. fluktuacemi při pohybu tělesa v [rovnovážné poloze](#), může uvažované těleso svoji rovnovážnou polohu opustit.



Obr. 22



Obr. 23

Ve [Sluneční soustavě](#) existuje několik soustav těles, na něž je možné nahlížet jako na dvojici těles, která se pohybují kolem společného těžiště: [Slunce](#) - [planeta](#), [Země](#) - [Měsíc](#), ... Librační body jsou tím výraznější, čím větší jsou hmotnosti uvažovaných těles, neboť pak se spíše najde těleso, které by mohlo být v libračním bodě v rovnováze a které má vzhledem k uvažovaným dvěma tělesům zanedbatelnou hmotnost. Nejvýrazněji se budou tedy librační body projevovat ve vzájemném [gravitačním působení](#) dvou těles s největší hmotností ve Sluneční soustavě - tj. [Slunce](#) a [Jupiter](#). Na [trajektorii](#) Jupitera skutečně existují dva librační body L_4 a L_5 , v nichž se udržuje skupinka [planetek hlavního pásu](#). Obě tyto skupiny se nazývají Trójané a od Jupitera mají úhlovou [vzdálenost](#) 60° , tj. trojúhelníky SSL_4 a SSL_5 jsou rovnostranné (viz obr. 23).